

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

総合かぜ薬

第②類医薬品

ビスティー[®]M顆粒

〈ビスティーM顆粒〉は熱を下げ、せきをしずめるマオウ、のどの炎症をやわらげるカンゾウ、おだやかに熱を下げるケイヒ、かぜの症状により消耗した体力を回復させるニンジンなど4種類の和漢薬に4種類の洋薬をプラスした総合かぜ薬で、和漢薬と洋薬のダブル処方が特に発熱・悪寒(さむけ)・頭痛・のどの痛みなどの症状に優れた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないこと

- ① 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)。

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気があらわれることがある)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- ① 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- ② 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- ③ 授乳中の人。
- ④ 高齢者。
- ⑤ 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- ⑥ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ⑦ 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- ⑧ 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

① 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群、 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

② 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること




口のかわき

<効能・効果>

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

<用法・用量>

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

	15才以上	11～15才未満	7～11才未満	7才未満
	1包	2/3包	1/2包	服用しないこと
1回量				×

用法・用量に関する注意

- ① 定められた用法、用量を厳守してください。
- ② 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

<成分・分量>

1日量（3包）中

成分	分量	はたらき
マオウ乾燥エキス (マオウとして3,400mg)	680mg	熱を下げるとともに、気管支を広げてせきを しずめます
カンゾウエキス粉末 (カンゾウとして741mg)	95mg	炎症をおさえることにより、のどの痛みやせ きを緩和します
ケイヒ乾燥エキス (ケイヒとして660mg)	30mg	頭痛をやわらげ、熱を下げます
人參乾燥エキス-E (ニンジンとして1,088mg)	75mg	かぜの症状による体力の消耗を回復させます
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをやわらげます
d-クロルフェニラミンマレイン 酸塩	3.5mg	くしゃみや鼻水などの症状をやわらげます
デキストロメトルフアン臭化水 素酸塩水和物	48mg	せきの中樞に作用してせきをしずめます
グアヤコールスルホン酸カリウム	250mg	たんを切れやすくし、せきを軽減します

添加物：トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、乳糖、アセスルファムK

保管及び取り扱い上の注意

- ① 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ② 小児の手の届かない所に保管してください。
- ③ 1包を分割し、残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- ④ 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- ⑤ 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

かぜの養生法

- 1.無理せず、安静第一を心がけましょう。安静にすることは、体力の回復とともに、かぜの治療を早めます。
- 2.食事はビタミン・カロリーの多いもの、消化の良いもの、あたたかいもの、水分の多いものをとるように心がけましょう。
- 3.入浴は熱が下がってから1～2日後にしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 京都薬品ヘルスケア株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

®登録商標