

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第②類医薬品

鼻水、発熱に

ビスティー[®]こども用かぜシロップ

ビスティーこども用かぜシロップは鼻水、のどの痛み、せき、発熱などの諸症状を緩和するお薬です。本剤には非ピリン系解熱鎮痛剤、鎮咳剤、去たん剤、抗ヒスタミン剤などが配合されています。本剤は、小児にとって服用しやすいように調整されたストロベリーの香りで甘味のあるシロップです。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、総合かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 呼吸器 | 息切れ、息苦しさ |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (ステーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |

(裏面へ続く)

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください





<効能・効果>

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

<用法・用量>

次の1回量を添付のカップではかり、1日3回毎食後および必要な場合には、就寝前に服用してください。

また、場合によっては、1日6回まで約4時間の間隔を置いて服用してください。

| | 3才以上 7才未満 | 1才以上 3才未満 | 6ヶ月以上 1才未満 | 3ヶ月以上 6ヶ月未満 | 3ヶ月未満 |
|-----|---|--|--|--|--------------|
| 1回量 | 10mL  | 7.5mL  | 6mL  | 5mL  | 服用しないこと × |

用法・用量に関連する注意

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

<成分・分量>

1日量（60mL）中

| 成分 | 分量 | 作用 |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| アセトアミノフェン | 300mg | 痛みを和らげ、熱を下げます。 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 1.16mg | 鼻水、鼻づまり、くしゃみの症状を軽減します。 |
| デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物 | 16mg | せきの中樞に作用してせきを和らげます。 |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 20mg | 気管支を拡張してせきを和らげ、たんを出しやすくします。 |
| グアヤコールスルホン酸カリウム | 83.3mg | 気管支に働いてたんをうすめ、はきだしやすくします。 |
| リポフラビン | 2mg | 消耗した身体への栄養補給に役立ちます。 |
| カンゾウエキス（原生薬換算量170mg） | 42.5mg | 炎症を和らげ、たんをとるはたらきがあります。 |
| ショウキョウエキス（原生薬換算量100mg） | 8.33mg | からだを温めるはたらきがあります。 |

添加物：白糖、クエン酸、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、パラベン、香料、エタノール、エチルパニリン、グリセリン、パニリン

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- 計量カップは使用のつど、よく水洗いして本剤とともに清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または次の所にお問い合わせください。

大昭製薬株式会社 おくすり相談室

電話 0748-88-4181

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 京都薬品ヘルスケア株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元 **大昭製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168

©登録商標