



第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

のどの痛み、せき、発熱に

チミコデ[®]錠

リゾチーム塩酸塩配合 総合かぜ薬

チミコデ錠は…

のどの痛み、発熱、頭痛などを抑えるアセトアミノフェン、せきを鎮めるdl-メチルエフェドリン塩酸塩及びチベピジンヒベンス酸塩、のどの炎症を抑えて痛みを鎮め、たんの切れをよくするリゾチーム塩酸塩及びカンゾウエキス末、鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどのかぜに伴うアレルギー症状を抑えるクロルフェニラミンマレイン酸塩を配合した錠剤の総合かぜ薬です。

 使用上の注意

 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、口内炎、下痢
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しき等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvensンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 (これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

口のかわき

【効 能】

かぜの諸症状(のどの痛み、せき、発熱、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】

下記の1回服用量を食後なるべく30分以内に服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	3回
7～14才	1錠	
6才	1/2錠	
6才未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量と働き】 6錠中

成 分	分 量	働 き
リゾチーム塩酸塩	60mg (力価)	のどの炎症を抑えて痛みを鎮め、たんの切れをよくします。
カンゾウエキス末	100mg <small>(原生薬分量70mg)</small>	甘草(生薬)のエキス末で、のどの炎症を抑え、たんの切れをよくします。
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、のどの痛みや頭痛、関節や筋肉の痛みを抑えます。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきを鎮めるとともに、たんを出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどのかぜによるアレルギー症状を抑えます。
チベピジンヒベンズ酸塩	75mg	せき中枢に働いて、せきを鎮めます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。

添加物として、無水ケイ酸、乳糖水和物、リン酸水素カルシウム水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有します。

●かぜの養生法

かぜはひきはじめに早く治しましょう。かぜを早く治すために、

- 食事は、栄養をつけ体力を回復させるために、高カロリーなタンパク質及びビタミンB群やCを多く含む、消化のよいあたたかいものをとりましょう。また、水分も十分にとるように心がけましょう。
- あたたかくして、十分な睡眠をとりましょう。汗をかいたら、汗ばんだ下着は早く着替えて、体を冷やさないようにしましょう。
- 体力を消耗して症状が重くならないように、無理をしないで早目に休養をとり安静にしましょう。安静にすることは体力の回復とともに、かぜの治療を早めます。
- 室内の空気の乾燥を防ぎましょう。

●保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用等お気付きの際は、お電話でお問い合わせ
(株)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/koukai/higai/>
電話0120-149-9311(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い取り
のお店又は下記にお電話、お申し込みください。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間9:00～17:00(土、日、夜間を除く)

発売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
製造販売元
テイカ製薬株式会社
富山県富山市荒川一丁目3番27号