

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《かぜ薬》

熱、せきに効く

# 第一かぜ錠

第②類医薬品

ジリュウエキス配合

第一かぜ錠は熱とせきによく効くかぜ薬です。解熱作用のあるアセトアミノフェンに加えて、古くから民間薬としてもちいられてきたジリュウを配合し、熱にすぐれた効果をあらわします。また、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物が中枢に働いてせきをしずめます。さらに、かぜの諸症状を和らげるクロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェインを配合した白色のフィルムコーティング錠です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 授乳中の人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

使用上の注意については、裏面もよくご覧ください。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
口のかわき

## 効能・効果

かぜの諸症状(発熱、せき、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

次の1回量を、1日3回、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	3回
11才以上15才未満	2錠	
5才以上11才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 錠剤の取り出し方  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量


第一かぜ錠は、大人1日量9錠中に次の成分を含んでいます。

成分	9錠中	作用
アセトアミノフェン	750mg	熱をさげ、頭痛・関節の痛みを和らげます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜによるアレルギー症状の鼻みず・鼻づまりを抑えます
デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物	48mg	せき中枢に作用して、せきをしずめます
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます
無水カフェイン	75mg	頭痛を和らげます
ジリュウエキ散N (原生薬換算量.....)	250mg 500mg	熱を下げます

添加物として、バレイショデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク及び酸化チタンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は、服用しないでください。



## 包装

PTP包装(12錠入シート)

問い合わせ先(お客様相談係)

電話番号：076-431-8863 [医薬情報部]  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)