

この説明文書は服用前に必ずお読みください。  
また必要なとき読めるように保存しておいてください。

2 部：2017年7月改訂

ショウキョウ乾燥エキス・ビタミンC配合総合かぜ薬

第2類医薬品

# パイロン<sup>®</sup>溶かしてのむかぜ薬G

## シオノギヘルスケア

- ◇ お湯または水に溶かしてのむ服用しやすいしょうが味のかぜ薬です。
- ◇ 解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンをはじめ、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりをおさえる抗ヒスタミン剤と2種類の鎮咳剤に加え、発熱で失われやすいビタミンCや、去痰作用のある生薬のカンゾウエキスを配合し、かぜの諸症状を緩和します。
- ◇ ノンカフェイン処方です。



### 使用上の注意……

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
(1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくをおこしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など）
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気などがあらわれることがあります）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 服用前後は飲酒しないでください
6. 長期連用しないでください

#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
(1) 医師または歯科医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人  
(3) 高齢者  
(4) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人  
(5) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がないなどが持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振などがあらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢などがあらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱などがみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しいなどがあらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむげ、のどの痛みなどがあらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさなどがあらわれる。

(裏面につづく)

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください  
便秘、口のかわき、眠気。
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください


……効能・効果……

かぜの諸症状（悪寒、発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

……用法・用量……

1包を約100mLのお湯または水にとかして、食後なるべく30分以内におのみください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	1包	3回
15才未満	服用させないこと	



- 定められた用法・用量を厳守してください。
- お湯を加えて服用する場合は、やけどをしないようにご注意ください。
- 冷水の場合は溶けにくいですが、よくかきまぜ分散させて、すぐにおのみください。

……成分・分量……


パイロン 溶かしてのむかぜ薬Gは、褐色の散剤で、3包（4g×3・成人1日量）中に次の成分を含有しています。

成分	含量(3包中)	はたらき
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みをおさえる
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえる
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきを止める
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきを止すめ、たんの切れをよくする
アスコルビン酸（ビタミンC）	500mg	かぜのときに消耗しやすいビタミンCの補給
カンゾウ乾燥エキス（原生薬換算量 500mg）	70mg	たんの切れをよくする
ショウキョウ乾燥エキス（原生薬換算量 300mg）	50mg	発汗を促し、かぜの回復を助ける

添加物としてアスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、白糖、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、香料、デンプンを含有しています。

……保管および取り扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) 本剤は吸湿しやすい製剤です。1包を開封後は速やかに服用してください。また、開封状態で置いておくと粒が変色することがあります。変色した場合は服用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



……かぜを早く治すために、次のことに心がけてください……

<p>■安静</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●無理な仕事や外出はさげる。</li> <li>●暖かくして十分な睡眠</li> </ul>	<p>■保温</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●着衣、室温・湿度に注意</li> <li>●熱のあるときは入浴はさげる。</li> </ul>	<p>■栄養・ビタミン</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●温かくカロリーの高い、消化しやすい食事</li> <li>●ビタミンの補給は抵抗力を高め、かぜの回復を早めます。</li> </ul>	<p>■のどの保護</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●禁煙と室内の湿度を適度に。</li> <li>●外出後は必ずうがい。</li> </ul>
--	--	---	---

……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。  
シオノギヘルスケア株式会社「**医薬情報センター**」  
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450  
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®：登録商標

販売元  
**シオノギヘルスケア株式会社**  
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

製造販売元  
**日東薬品工業株式会社**  
京都府向日市上植野町南開35-3