

第②類医薬品

非ピリン系総合感冒薬（かぜ薬）


小児用 **新キコデ® B**

販売名：小児用新キコデB

小児用新キコデBは、非ピリン系の解熱鎮痛剤を中心に「かぜ」による熱、せき、痛み、鼻水などの諸症状に効果をあらわすすぐれた成分を配合した非ピリン系の総合感冒薬です。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと 

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）


3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

（眠気等があらわれることがある。）

4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

5. 服用前後は飲酒しないこと

6. 過量服用・長期連用しないこと

相談すること 

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。高熱、むくみ、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経科	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢、尿量の減少等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

裏面もよくお読みください

症状の名称	症状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

3才以上7才未満：1回5.0mL 1才以上3才未満：1回3.7mL
6カ月以上1才未満：1回3.0mL 3カ月以上6カ月未満：1回2.5mL
1日3回食後及び必要な場合には就寝前に服用する。また場合によっては、約4時間ごとに1日6回まで服用しても差し支えない。(目盛り付き計量カップ添付)

用法・用量に関連する注意

- ・用法・用量を厳守すること。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- ・2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

成分・作用

成 分	1日量 (1本:30mL)中	主 な 作 用
非ピリン系解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン 300mg	「かぜ」による悪寒、発熱、頭痛、関節の痛みを和らげます。
抗ヒスタミン剤	クロルフェニラミンマレイン酸塩 2.5mg	「かぜ」のひきはじめにみられる鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状に効果をあらわします。
鎮咳剤	ジヒドロコデインリン酸塩 5mg	鎮咳作用が強く、常用されているせきどめ薬で、咳中枢に働いて「せき」を和らげます。
気管支拡張剤	d _l -メチルエフェドリン塩酸塩 10mg	気管支を拡張し、せきを和らげてのどを楽にします。
カフェイン剤	無水カフェイン 50mg	解熱鎮痛剤の鎮痛効果を増強します。また、配合成分による眠気の副作用防止に役立ちます。
去痰性生薬	カンゾウエキス (日局カンゾウ1.4gに相当) 360mg	甘草は鎮咳・去痰作用のあることが知られています。気道粘膜にねばりついている「たん」をうすめ、はき出しやすくします。

添加物として白糖、D-ソルビトール、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料を含有します。
・生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

小児用新キコデBの効果

1. 発熱、痛みに
非ピリン系の解熱鎮痛剤が「かぜ」による悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みにすぐれた効果をあらわします。
2. せき・たん……
鎮咳剤が咳中枢に働いて「せき」を和らげます。
気管支拡張剤および去痰作用のある生薬エキスが配合されていますので、気管支を広げて「せき」を和らげ、気道粘膜にねばりついている「たん」をうすめてはき出しやすくし、のどを楽にします。
3. 鼻水、鼻づまり、くしゃみに……
抗ヒスタミン剤が配合されていますので「かぜ」のひきはじめに見られる鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状に効果をあらわします。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 計量用カップは使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管すること。
- (5) 開栓後は長期保存しないこと。

お問い合わせ先

本製品について、何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。
オール薬品工業株式会社 くすり相談室 電話番号 06-6491-6222 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

販売 辯 天 宗 施 薬 部
奈良県五條市野原西4丁目6-25

発売元 **チベン製薬株式会社**
大阪府茨木市西穂積町3番8号

製造販売元 **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地