

持続性総合かぜ薬

エスタック[®]SR錠

S.TAC-SR TABLETS

1日2回服用のかぜ薬

○エスタック SR錠は、効果が長く続くように工夫された持続性のかぜ薬ですから、1日2回（朝・夕食後）の服用ですぐれた効果をあらわします。

かぜの諸症状によく効きます

- 熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげます。
- せきをしずめ、たんを切ります。
- くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、眠気防止薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気があらわれることがあります。）

4. 服用時は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)授乳中の人。(4)高齢者。(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。 高熱、排尿困難(8)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

■ 効能・効果

かぜの諸症状（発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■ 用法・用量

次の1回量を1日2回、朝・夕食後なるべく30分以内に服用します。

年齢	成人(15才以上)	11才～14才	7才～10才	7才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量（1日2回、朝・夕食後なるべく30分以内に服用）を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分と作用

エスタックSR錠は、6錠（成人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成分	6錠中	作用
アセトアミノフェン	900mg	熱を下げ、痛みを和らげます。
ジヒドロコデインリン酸塩	24mg	せきを和らげ、たんを切り取ります。
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきを和らげ、たんを切り取ります。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
無水カフェイン	50mg	頭痛を和らげます。
アスコルビン酸(ビタミンC)	100mg	消耗しがちなビタミンを補います。

添加物として、クロスCMC-Na、硬化油、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、メタクリル酸コポリマーS、赤色3号、黄色5号を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早めに服用してください。
- (7) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>