

第②類医薬品

かぜサン顆粒



使用上の注意

してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります]

- 次の人は服用しないでください
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15歳未満の小児。
 - 出産予定日12週以内の妊婦。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

使用上の注意については、裏面もご覧ください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効能又は効果】

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法及び用量】

成人(15歳以上)1回……1包

15歳未満 服用しないでください

1日3回食後なるべく30分以内に白湯又は水にて服用してください。

【成分及び分量】 1日量(3包)中 1包 1200mg

成 分	分量	成 分	分量
アスピリンアルミニウム	720mg	葛根湯乾燥エキス	1000mg
アセトアミノフェン	390mg	(カッコン1.6g、マオウ0.8g、タイソウ0.8g、ケイヒ0.6g、シャクヤク	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	0.6g、カンゾウ0.4g、シヨウキョウ	
クエン酸チペピジン	60mg	0.2gより製した乾燥エキス)	
無水カフェイン	120mg		

添加物としてd-ボルネオール、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、結晶セルロース、乳糖、バレイシヨデンブ、乾燥水酸化アルミニウムゲルを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 漢方エキス剤は湿気を吸いやすいので、湿気のために少し色が黒くなったり固まったりすることがありますが、効能・効果にかわりありません。
- (5) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 大同製薬株式会社
富山県高岡市三女子113

お問い合わせ先 大同製薬株式会社
お客様相談室 電話：(0766)22-0998
受付時間：9:00～16:00(土、日、祝日を除く)