

総合かぜ薬  
**カゼコルハイA**

**特 徴**

- 頭痛、発熱、さむけにすぐれた効きめをあらわします。
- 漢方の代表的なかぜ薬「葛根湯」(かっこんとう)に、西洋薬を配合しました。
- 6種の成分がバランスよく働いて、かぜの諸症状を緩和します。

**⚠ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
  - (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬  
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (7) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
  - (8) 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)

ぜ ん そ く

- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
口のかわき

## 効能

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和



発熱



頭痛



のどの痛み

## 用法・用量

次の量を、食後なるべく30分以内に、水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分

成人の1日服用量3包(4.5g)中

成分	1日量(3包)	作用
葛根湯乾燥エキス	1350mg (原生薬 6750mgに相当)	かぜに用いる漢方薬「葛根湯」のエキスで、悪寒や肩・首筋のこわばりをやわらげます。
エテンザミド	500mg	解熱鎮痛作用で熱を下げ、のどや関節の痛みをやわらげます。
アセトアミノフェン	350mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状をおさえます。
チペピジンヒベンズ酸塩	65mg	せきをしずめ、痰を排出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	痛みをおさえる働きを助けるほかに、頭痛をやわらげます。

添加物としてバレイショデンプン、乳糖、セルロース、白糖を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1包を分割した残りをを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：03(3370)7174(代表)  
受付時間：9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構  
副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

発売元  **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **大草薬品株式会社**  
神奈川県横須賀市森崎1-17-15