

総合感冒薬

小児用ヒルAシロップ 第②類医薬品

■販売名：小児用ヒルAシロップ

小児用ヒルAシロップは服用しやすいように味と香りを工夫した黒褐色のシロップ剤で、解熱・鎮痛作用を持つアセトアミノフェンに、せき、鼻水・鼻づまりなどを抑える成分を効果的に配合した総合感冒薬で、かぜの諸症状を緩和してくれます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）

4. 授乳中の方は本剤を服用しないで、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

5. 服用前後は飲酒しないでください

6. 長期連用しないでください

☞ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1)医師または歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5)次の症状のある人：高熱、排尿困難(6)次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

裏面もお読みください

再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

■効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

■用法・用量

※下記の量を添付の目盛付計量カップではかり、食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
3才以上 7才未満	5mL	3回食後 ・必要な場合には就寝前 ・止むを得ない場合には約4時間の間隔を置いて6回まで
1才以上 3才未満	3.5mL	
6ヶ月以上 1才未満	3mL	
3ヶ月以上 6ヶ月未満	2.5mL	
3ヶ月未満の乳児	服用しないでください。	

（用法・用量に関連する注意）

- 用法及び用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

■成分・分量 1びん(30mL)中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	300mg	熱を下げ、痛みを和らげる
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりをおさえる
ジヒドロコデインリン酸塩	8mg	せきを鎮め、たんを切る
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	18mg	
無水カフェイン	30mg	頭痛を和らげる

※添加物としてカンゾウエキス、ケイヒチンキ、白糖、カラメル、エタノール、安息香酸ナトリウムを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。
- 使用後は、汚染を防ぐため、ビンの口を拭いてからフタをよく閉めてください。
- 一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早くご使用ください。
- 計量カップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願い申し上げます。

合名会社 東宝製薬
電 話 058-251-6668（代表）
受付時間 10:00～16:00
（土、日、祝日を除く）

製造販売元

合名会社 東宝製薬
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地