

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



木曾御嶽山 六こん風邪薬

第②類医薬品

ゴオウ・キキョウ・ジリュウ配合

六こん風邪薬は、生薬を配合した総合かぜ薬です。熱、のどの痛みをはじめ、かぜの諸症状を緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

- 次の人は服用しないこと
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
（眠気等があらわれることがある。）
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼 吸 器	息切れ、息苦しさ
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る。息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2カプセル	3回
7歳以上 15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法及び用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部分を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



成分・分量

6カプセル（成人1日量）中

成分	分量	はたらき
ゴオウ	3mg	鎮静作用がある
キキョウ末	270mg	たんを切れやすくする
ジリュウエキス	108mg	熱を下げる
(原生葉ジリュウ402.84mgに相当する)		
アセトアミノフェン	535mg	熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛みをやわらげる
エテンザミド	400mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりをやわらげる
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	45mg	せき中枢に直接作用し、無駄なカラセキをおさえる
d,l-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	気管支をひろげ、せきをしずめる
無水カフェイン	125mg	頭痛をやわらげる
チアミン硝化物	15mg	消耗しがちなビタミンを補う
リボフラビン	6mg	

添加物としてパレイシヨデンプン、ゼラチン、酸化チタン、赤色3号、黄色5号、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、これは本剤に含まれるリボフラビン（ビタミンB₂）によるものです。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- 使用期限が過ぎた製品は、服用しないこと。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、販売店または下記までお願いします。
長野県製薬株式会社 お客様相談室
電話：フリーダイヤル 0120-100-975
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

発売元
株式会社 卯野薬房
〒397-0201 長野県木曾郡王滝村2708-1
電話 0264-48-2800

製造販売元
長野県製薬株式会社
長野県木曾郡王滝村此の島100-1