

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

かぜ薬

コッキンカプセルF

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1. 次の人は服用しないで下さい
 - (1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります。)
 4. 服用時は飲酒しないで下さい
 5. 長期連用しないで下さい



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
口のかわき

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和。

用法・用量

成人(15歳以上) 1回2カプセル、7歳以上15歳未満 1回1カプセル、1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

- (1) 本剤は7歳未満の幼児に服用させないで下さい。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

1日量(6カプセル)中、アセトアミノフェン400mg、エテンザミド600mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg、ノスカピン34mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩40mg、無水カフェイン120mg、リボフラビン6mg

添加物：トウモロコシデンプン、炭酸Ca、セルロース、CMC-Na、カプセルにゼラチン、赤色3号、黄色5号、青色1号、酸化チタン及びラウリル硫酸Na

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

日本ビタミン化学株式会社

お客様相談窓口：TEL076-467-5200

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00(土、日、祝日を除く)