

## 第2類医薬品

生薬牛黄配合


## 新テキマン錠

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと 

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期運用しないこと

相談すること 

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザに罹っている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
  - 次の診断を受けた人  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	泌尿器	排尿困難
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下
精神神経系	めまい		

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## 用法及び用量

15才以上	1回	2錠
7才以上15才未満	1回	1錠
7才未満は服用しないこと		
1日3回、食後なるべく30分以内に服用する。		

### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってシートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



## 成分・分量 1日量(6錠)中

成分	分量	はたらき
アセトアミノフェン	660mg	かぜによる悪寒や発熱をおさえ、頭痛や関節、筋肉の痛みをしずめます。
エテンザミド	400mg	
ジヒドロコデインリン酸塩	16mg	かぜによるせきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	かぜによる不快なたん、せきを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	かぜによるくしゃみ、鼻みず、鼻づまりといった諸症状を緩和します。
無水カフェイン	75mg	かぜによる諸症状の改善を補助します。
ゴオウ(牛黄)	3mg	熱を下げるはたらきがあります。

添加物としてカルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース ステアリン酸Mg、マクロゴール、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ゼラチン、アラビアゴム、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わる。）
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## お問い合わせ先

発売元 **東邦薬品工業株式会社**  
 奈良県橿原市縄手町字久保カイト214-1  
 ☎ 0744 - 22 - 2561

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**  
 富山市水橋町555番地  
 ☎ 076 - 478 - 0205

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931