

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

かぜぐすり 新龍G 第②類医薬品

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある)

4. 服用前後は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人: 高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口の渇き、眠気

4.5～6回服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法及び用量】

15才以上…………… 1回4錠宛
 7才以上15才未満 …… 1回2錠宛
 5才以上7才未満 …… 1回1錠宛
 1日3回食後なるべく30分以内に服用すること。

＜用法及び用量に関する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分及び分量】 1日量（12錠）中

アセトアミノフェン600mg・エテンザミド500mg・クエン酸チペピジン45mg・無水カフェイン150mg・クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg
 添加物として、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、乳糖、クエン酸Ca、ステアリン酸Mg、マクロゴール、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ゼラチン、アラビアゴム、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、パラフィン、カルナウバロウを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 期限を過ぎたものは、服用しないこと。

【問い合わせ先】

製造販売元 **渡辺薬品工業株式会社**
 富山市水橋北馬場1番7
 TEL (076) 479-9123

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931