

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 総合感冒薬

### 第2類医薬品

# カゼセラカプセル

カゼセラカプセルは、消炎酵素成分のセラペプターゼ、解熱鎮痛成分のアセトアミノフェン、抗ヒスタミン成分のクロルフェニラミンマレイン酸塩のほかdl-メチルエフェドリン塩酸塩、ビタミンなどが配合された総合感冒薬です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる〕

- 次の人は服用しないでください  
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（眠気があらわれることがあります。）
- 服用時は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)授乳中の人。  
(4)高齢者。  
(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(7)次の症状のある人。 高熱、排尿困難  
(8)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝 機 能 障 害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
間 質 性 肺 炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。）
ぜんそく	

- (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
□のかわき

裏面もよくお読みください。

**【効能・効果】**

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和



のどの痛み



せき・たん



鼻水・鼻づまり

**【用法・用量】**

次の量を、食後なるべく30分以内に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	3回
7歳未満	服用しないでください	

**〈用法・用量に関連する注意〉**

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- カプセルの取り出し方  
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を（PTPシートの取り出し図）指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。  
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）

**【成分・分量】**

1日量（6カプセル）中

成分	分量
セラペプターゼ	30000セラペプターゼ単位
アセトアミノフェン	900mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
無水カフェイン	75mg
クロペラスチン塩酸塩	48mg
チアミン硝酸物（ビタミンB <sub>1</sub> ）	18mg
リボフラビン（ビタミンB <sub>2</sub> ）	6mg

添加物として、乳糖水和物、部分アルファ化デンプン、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、セラック、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸、バレイショデンプン、ラウリル硫酸Na、ゼラチンを含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります）
- 配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**■お問い合わせ先**

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記にお願い申し上げます。

株式会社 廣貴堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



**株式会社 廣 貴 堂**

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）