

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 消炎酵素セラペプターゼ配合かぜ薬

アスピタ・セラ

アスピタ・セラは、炎症を抑えてのどの痛みや鼻づまりを改善する消炎酵素セラペプターゼをはじめ、アセトアミノフェンやクロルフェニラミンマレイン酸塩などかぜの諸症状に有効な成分やビタミンを配合した服用しやすいカプセル剤です。



⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください。
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去たん薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
- 服用時は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。

相談すること 🗑

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。
 - (4)高齢者。
 - (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7)次の症状のある人。
高熱、排尿困難、血液凝固異常（出血傾向）
 - (8)次の診断を受けた人。
肝臓病、腎臓病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、糖尿病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感 |
| 精神神経系 | めまい |
| その他 | 排尿困難、鼻出血、血たん |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群) | 高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄だん（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。 (これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けてください。) |
| ぜんそく | |

- (2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

裏面もお読みください

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

口のかわき

効能又は効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法及び用量

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人（15歳以上） | 2カプセル | 3回 |
| 7歳～14歳 | 1カプセル | |
| 7歳未満 | 服用しないこと | |

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分及び分量

6カプセル（成人の1日量）中

| 成分 | 含量 | はたらき |
|------------------------------|-------|-----------------------------------|
| セラペブターゼ | 15mg | 腫れをおさえ、のどの痛み・鼻づまりを和らげ、たんを出しやすくします |
| アセトアミノフェン | 900mg | 発熱、頭痛、のどの痛み、関節・筋肉の痛みをおさえます |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5mg | くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます |
| dL-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg | せき、たんを鎮めます |
| クロベラスチン塩酸塩 | 48mg | せきを鎮めます |
| 無水カフェイン | 75mg | 頭痛を鎮めます |
| チアミン硝酸物（ビタミンB ₁ ） | 18mg | かぜによるビタミン消耗を補います |
| リボフラビン（ビタミンB ₂ ） | 6mg | |

添加物として乳糖水和物、部分アルファ化デンプン、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロースフタル酸エステル、セラック、グリセリン脂肪酸エステル、ステアリン酸、パレイシヨデンプン、黄色5号、ラウリル硫酸Na、ゼラチンを含有しています。

＜成分及び分量に関連する注意＞

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂（リボフラビン）によるものです。

《かぜの養生法》

かぜをこじらせると合併症をおこし、体の調子を大きくくずしてしまふことがありますから、保温・保湿に心掛け、消化によい栄養豊富な食物をとり安静にして、早めに治すことが大切。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

包装

PTP 12カプセル

問い合わせ先

- 1) 本製品の購入先
- 2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021
受付時間 9:00～16:30（土・日・祝日を除く）

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2