

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## かぜ薬

### 第2類医薬品

### 総合かぜ薬

鼻水、鼻づまり、のどの痛みに

# 新ルルA<sup>®</sup>ゴールド<sup>®</sup>細粒

《新ルルAゴールド細粒》は、

- 3種の基準外成分、「クレマスチンフマル酸塩（持続性抗ヒスタミン剤）」、「リゾチーム塩酸塩（消炎酵素剤）」、「ベラドンナ総アルカロイド（副交感神経遮断剤）」や、「アセトアミノフェン（解熱鎮痛剤）」等を配合した総合かぜ薬です。
- サッと溶けて爽やかな服用感です。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- (3) フェニルケトン尿症の人  
(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため)

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

#### \* 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい

#### 5. 服用時は飲酒しないで下さい

#### 6. 長期連用しないで下さい



#### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人  
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

##### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること)
ぜんそく	

##### (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

#### 3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

便秘、口のかわき

## ■ 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、のどの痛み、せき、たん、くしゃみ、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

## ■ 用法・用量

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回 食後なるべく30分以内に服用して 下さい
11歳以上15歳未満	2/3包	
6歳以上11歳未満	1/3包	
6歳未満	服用しないで下さい	

〈用法・用量に関する注意〉

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## ■ 成分

《新ルルAゴールド細粒》は、白色の細粒で、3包(1包1.2g)中の成分及び作用は次のとおりです。

成分	含量 (3包中)	作用
クレマスチンフマル酸塩	1.34mg	かぜのアレルギー症状(鼻水、くしゃみ)をおさえます
リゾチーム塩酸塩	(リゾチームとして) 90 mg (力価)	鼻やのどの炎症をしずめ、粘稠なたんを切れやすくします
ベラドンナ総アルカロイド	0.3 mg	鼻水をおさえます
アセトアミノフェン	900 mg	熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます
ジヒドロコデインリン酸塩	24 mg	せきをしずめます
ノスカピン	48 mg	
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60 mg	気管支をひろげ、せきをしずめます
無水カフェイン	75 mg	頭痛をやわらげます
ベンフォチアミン (ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	24 mg	ベンフォチアミンは吸収のよいビタミンB <sub>1</sub> 誘導体で、かぜの時に消耗の激しいビタミンB <sub>1</sub> をおぎないます

添加物：アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、セルロース、l-メントール、香料

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8  
電話 03(6667)3232  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ルルについて詳しくは <http://www.lulu.jp/>

T04®登録商標



製造販売元  
**第一三共ヘルスケア株式会社**  
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>