



使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

*:2017年7月(使用上の注意、
用法・用量に関連する注意改訂)

リゾチーム塩酸塩、ビタミンC・B2配合

ペラックかぜ薬 細粒

第2類医薬品

総合感冒薬

ペラックかぜ薬の特徴

かぜにかかると鼻水、くしゃみ、発熱、頭痛、のどの痛み、せき、関節や筋肉の痛みといった様々な症状がでてきます。これらのかぜ諸症状に対して、ペラックかぜ薬は、抗炎症作用のあるリゾチーム塩酸塩、ビタミンC・B2を含む10成分を配合した総合感冒薬です。これらの配合成分がはたらいて、かぜの諸症状の緩和に効果をあらわします。更に、サッと溶ける黄色の細粒で携帯に便利な包装です。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

(眠気等があらわれることがあります)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
5. 服用前後は飲酒しないで下さい。
6. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人：高熱、排尿困難
- * (6) 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症状 |
|-------|-------------|
| 皮膚 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症状 |
|---|--|
| ショック (アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腎障害 | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。 |
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| ぜんそく | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。 |
| 再生不良性貧血 | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症 | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。 |
| * 呼吸抑制 | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

(裏面に続く)

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

便秘、口のかかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|------------|---------------------|
| 成人（15歳以上） | 1包 | 3回 （食後なるべく30分以内） |
| 11歳以上15歳未満 | 2/3包 | |
| 7歳以上11歳未満 | 1/2包 | |
| 3歳以上7歳未満 | 1/3包 | |
| 3歳未満 | 服用しないで下さい。 | |

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

* (3) 12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先して下さい。

成分・分量

3包（1包1g）中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|-----------------|----------|------------------------------|
| リゾチーム塩酸塩 | 60mg（力価） | のどの炎症をおさえて、たんを出しやすくします。 |
| アセトアミノフェン | 900mg | 熱を下げ、関節・筋肉の痛み、のどの痛みなどを緩和します。 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 7.5mg | くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどを緩和します。 |
| ジヒドロコデインリン酸塩 | 24mg | せき中枢にはたらい、せきをしずめます。 |
| ノスカピン | 48mg | |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 60mg | 気管支を上げ、呼吸を楽にし、せきをしずめます。 |
| グアヤコールスルホン酸カリウム | 240mg | 気管にからまるたんをやわらかくして、出しやすくします。 |
| 無水カフェイン | 75mg | 頭痛を緩和します。 |
| リボフラビン | 12mg | ビタミンB ₂ を補給します。 |
| アスコルビン酸カルシウム | 300mg | 発熱により失われたビタミンCを補給します。 |

添加物：D-マンニトール、セルロース、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸

〈成分・分量に関連する注意〉

(1) 本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB₂）により、尿が黄色になることがあります。

(2) 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）

(4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

®登録商標



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元

DAITO 日イト 株式会社

富山県富山市八日町326番地