

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

# 小児用 チルダンシロップ

小児用チルダンシロップは、ジリュウ(解熱生薬)を配合した小児用のシロップです。

## 特 長

- ① 4種類の成分が働いて、かぜによる発熱、頭痛、関節の痛みなどを緩和します。
- ② 甘くて飲みやすい、いちご味のシロップ剤です。
- ③ 小児の誤飲を防ぐため、安全キャップを使用しています。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないで下さい

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含む 有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)。

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい

(眠気があらわれることがあります。)

#### 4. 服用時は飲酒しないで下さい

#### 5. 長期連用しないで下さい

### 相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイアンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること。)
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さいのかわき。

## 効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

## 用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として4時間の間隔をおいて服用して下さい。

年 齢	1回量	備 考
3才以上7才未満	5.0mL	添付の計量コップを用い、年齢に応じて、左記の分量を計して下さい。
1才以上3才未満	3.5mL	
6ヵ月以上1才未満	3.0mL	
3ヵ月以上6ヵ月未満	2.5mL	
3ヵ月未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

## 成分・分量

成 分	1日量(30mL)中	働 き
アセトアミノフェン	250.0mg	発熱、頭痛などの緩和
マレイン酸クロルフェニラミン	2.5mg	鼻水、鼻づまりの緩和
無水カフェイン	50.0mg	頭痛の緩和
ジリュウ流エキス(原生薬換算量165mg)	0.165mL	発熱の緩和

添加物としてD-ソルビトール、クエン酸、パラベン、安息香酸Na、プロピレングリコール、香料、白糖、カラメルを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビン口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- (5) 使用期限はケース底面及びビンラベルに記載されています。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
- (7) 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈でんを生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

安全キャップの使用方法は、ケース側面及びビンラベルに記載してあります。

キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯(50～60℃)に2～3分つけると開けやすくなります。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社  
TEL (0748) - 62 - 4161  
FAX (0748) - 62 - 3417  
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

# 日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62