

2014年7月（記載要領変更に伴う改訂）

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

解熱鎮痛薬

新サワヤカゲン錠

第②類医薬品

新サワヤカゲン錠は、解熱鎮痛剤としてよく使われるアセトアミノフェン、エテンザミド、無水カフェインに、疼痛を緩和する漢方処方に用いられている「芍薬」と「甘草」のエキスを加えてありますので、頭痛、歯痛、神経痛、生理痛など、日常経験するいろいろな「痛み」にすぐれた効き目をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないでください
4. 長期連用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎 障 害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

(裏面もお読みください。)

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2)悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

次の量を、なるべく空腹時をさけて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	6時間以上の間隔 を置いて2回まで
11才以上15才未満	2錠	
11才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分・分量 6錠（成人1日2回量）中

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	600mg	熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛みなどの症状をやわらげます。
エテンザミド	700mg	
無水カフェイン	140mg	熱や痛みをとる成分のはたらきを補助します。
カンゾウ(甘草)エキス末	100mg〔カンゾウとして700mg〕	炎症を抑え、痛みをしずめます。
シャクヤク(芍薬)エキス	140mg〔シャクヤクとして700mg〕	痛みの中枢に作用して、鎮痛効果をあらわします。

添加物としてメタケイ酸アルミン酸Mg、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、クロスカルメロースNa、タルク、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話(076)435-5055
午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **中部薬品株式会社**
富山県射水市戸破69-12

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15-1