

緑のづつう薬 顆粒剤

トクシキンA

づつう

神経痛

生理痛に

第2類医薬品

非ピリン系

TokushinA

主効	}	頭痛
		神経痛
		肩こり痛

販売名 トクシンA

第2類医薬品

効能 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

用法用量 2) 悪寒・発熱時の解熱
15才以上……………1回1包 7才以上11才未満……………1回1/2包
11才以上15才未満…1回2/3包 3才以上7才未満 …… 1回1/3包
何れも1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと。小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分分量 2包中
(1包1,200mg) 日局 アセトアミノフェン…600mg 日局 無水カフェイン ……200mg
日局 エテンザミド ……600mg 日局 プロモバレリル尿素 ……400mg
添加物としてカンゾウ末、緑茶末、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、香料、黄色4号(タートラジン)、青色1号を含む。

使用上の注意

1. 次の人は服用しないこと。
(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
3. 服用に際しては説明文書をよく読むこと。
4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

製造販売元 大和製薬株式会社 奈良県御所市東佐味334-1
お問い合わせ先 ☎0745-66-0112

2包入(1包1.2g) ¥250+税 配置期限

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

紙

外袋



内袋

(いたみどめ、ねつさまし)

⚠ 解熱鎮痛薬 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬。

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気があらわれることがある)

4. 服用時は飲酒しないこと

5. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (5) 高齢者。
- (6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (7) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- (8) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、
歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の
症状があらわ
れた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等 とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たく なり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶ くれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や 目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色 くなる)等があらわれる。
ぜんそく	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

【用法及び用量に関する注意】

・小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の折り口を折
り返して保管し2日以内に服用すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

大和製薬株式会社
お問い合わせ先 ☎0745-66-0112

トクシンA
ネオアロピタン