

頭痛・歯痛・神経痛

非ピリン剤

第②類医薬品

トッコ-散



TRADE MARK



株式会社 西川栄寿堂

◎ 痛みと熱に ◎ 第②類医薬品

トッコ-散

効能又は効果

頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・関節痛・
神経痛・腰痛・肩こり痛の鎮痛
悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

大人 15才以上 1回 1包宛
15才未満は服用しないこと。

1日1回1包を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。

成分及び分量 1日量(1包0.9g)中

日局 アスピリン…………… 0.4g

日局 プロモバレリル尿素… 0.2g

日局 カフェイン水和物… 0.1g

賦形剤 日局 バレイシヨデンブ… 0.2g

注意

1. 次の人は服用しないこと。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、
かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3)15歳未満の小児。(4)出産予定日12週以内の妊婦。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと。
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、
歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
4. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
密栓して保管すること。
6. 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

発売元 株式会社 西川栄寿堂 副作用被害救済制度
奈良県高市郡高取町大字清水谷1025 ☎ 0120-149-931

2包入(1包0.9g×2) ￥200

配置期限



分包:PE

製造販売元 大師製薬株式会社 電話: 0744-23-6000
奈良県橿原市四分町79-2 (お客様相談窓口)

この使用上の注意は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

⚠ トッコー散 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。(4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(眠気等があらわれることがある。)

4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
そ の 他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意 用法及び用量を厳守すること。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。