

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保存してください。

## 第②類医薬品

## ケロリットD (解熱鎮痛薬)

## ⚠ 使用上の注意

## してはいけないこと ☒

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

## 1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります)

## 4. 服用前後は飲酒しないでください 5. 長期連用しないでください

## 相談すること ■

## 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(4)高齢者。  
(5)薬などによるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6)次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

使用上の注意については、裏面もよくご覧ください

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。 眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

#### 【効能又は効果】

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

#### 【用法及び用量】

成人（15歳以上）1回1包 11歳以上15歳未満1回2/3包 7歳以上11歳未満1回1/2包  
 5歳以上7歳未満1回1/3包 5歳未満服用しないでください。  
 いずれも1日3回を限度とし、なるべく空腹時を避けて服用し、服用間隔は4時間以上おいてください。

#### 【用法及び用量に関連する注意】

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分及び分量】 1日量（3包）中 1包1000mg

アセトアミノフェン …… 900mg ・ エテンザミド …… 700mg  
 プロモバレリル尿素 …… 240mg ・ 無水カフェイン …… 150mg  
 添加物としてd-ボルネオール、クエン酸カルシウム、バレイシヨデンブン、黄色5号を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 **大同製薬株式会社**

富山県高岡市三女子113  
 お客様相談窓口 電話：(0766) 22-0998

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931