

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

非ピリン系鎮痛薬

バニシペイン[®]

痛みは、前ぶれもなく突然に起こってきます。頭痛・歯痛・生理痛・神経痛等痛みはともつらいものです。

バニシペインは鎮痛作用を有するアセトアミノフェン、エテンザミドと緩やかな催眠鎮静作用を有するアリルイソプロピルアセチル尿素及び気分を爽快にする無水カフェインをバランス良く配合し、痛みに効果があります。また、解熱作用を併わせもつアセトアミノフェンとエテンザミドの作用で解熱にも効果があります。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。
 - (4)水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）
 - (5)高齢者。
 - (6)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (7)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (8)次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、やけど様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄だん（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
ぜんそく	

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合

効能又は効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人(15歳以上)	3錠	2回を限度とする
11歳～14歳	2錠	
7歳～10歳	1½錠	
5歳～6歳	1錠	
乳幼児(5歳未満)	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込みだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分及び分量

3錠中

成 分	含 量	は た ら き
アセトアミノフェン	225mg	頭痛、歯の痛み、関節や筋肉の痛みをおさえ、熱を下げます
エテンザミド	500mg	頭痛、歯の痛み、関節や筋肉の痛みをおさえ、熱を下げます
アリルイソプロピルアセチル尿素	60mg	痛みをやわらげ、鎮静効果があります
無水カフェイン	120mg	頭痛を鎮めます

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、クロスカルメロースNa、セルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先

- 1) 本製品の購入先
- 2) 佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021 受付時間 9:00～16:30 (土・日・祝日を除く)

製造販売元

 **佐藤薬品工業株式会社**
奈良県橿原市観音寺町9番地の2