

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

チオノール

第②類医薬品

解熱鎮痛薬

△使用上の注意

☒してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
- (4)高齢者。

(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6)次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

裏面に続く↓

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
高質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛(のどの痛み)・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み(ねんざ痛)・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 悪寒(発熱によるさむけ)・発熱時の解熱

用法・用量

次の1回量をなるべく空腹時をさけて服用してください

年齢	1回量	1日服用限度	服用間隔
成人(15歳以上)	1包		
11歳以上 15歳未満	2/3包	2回	6時間以上
7歳以上 11歳未満	1/2包		

3歳以上 7歳未満	1/3包	2回	6時間以上
1歳以上 3歳未満	1/4包		
1歳未満の乳児	服用しないでください。		

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1日量(2包)中に次の成分を含有しています。

成分	分量
アセトアミノフェン	600mg
エテンザミド	680mg
アリルイソプロピルアセチル尿素	120mg
無水カフェイン	90mg

添加物として、合成ケイ酸アルミニウム、乳糖水和物、軽質無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えしないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
☎0120-415-688 受付時間9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1