

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

第2類医薬品

乗り物酔い用薬

乗り物酔いによる めまい・吐き気・頭痛 ウエルシア乗り物酔い止めQD錠

特 徴

- 1日1回の服用で、乗り物酔いによる「めまい・吐き気・頭痛」を予防します。
- 気分が悪くなってからでも、すぐに服用すれば、「めまい・吐き気・頭痛」の症状を緩和します。
- 口に含むとはやく溶け、水なしで飲めます。
- 外出先でも服用しやすい、携帯に便利なPTP包装です。
- 爽やかなメントール味で服用しやすいチュアブル錠です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

フェニルケトン尿症の人。

(本剤はL-フェニルアラニン化合物を含有するため。)

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の乗り物酔い用薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬)

3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

□のかわき、便秘

効能・効果

乗り物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防および緩和

用法・用量

次の量をかむか、口中で溶かして服用する。ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分前に服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 錠剤の取り出し方:右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)

(錠剤の取り出し図)



成分

成人1日量(2錠)中

成分	分量	はたらき
塩酸メクリジン	25mg	嘔吐中枢への刺激伝達をしゃ断し、めまい・吐き気を抑える。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.25mg	自律神経の興奮状態を緩和し、めまい・吐き気を抑える。

添加物:セルロース、トウモロコシデンプン、炭酸Ca、ケイ酸Ca、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、エリスリトール、l-メントール、ステアリン酸Mg

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 本剤の使用期限は外装に記載してあるので、使用期限内に服用すること。

乗物酔いの予防には

- (1) 乗物に乗る前夜は、十分に睡眠をとりましょう。
- (2) 消化の良い食物を適度に食べ、胃腸の調子を整えましょう。
- (3) 座席はなるべく揺れの少ない場所に、姿勢を楽にしてゆったりとすわりましょう。
- (4) 窓から遠くの景色を眺めたり、おしゃべりなどで気分をまぎらわしましょう。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03(6667)3232
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町滝879番地