

この説明書は、使用前によくお読みください。
 なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

乗物酔い薬

第2類医薬品

トラベラソフト

トラベラソフトは、塩酸メクリジンを有効成分とする乗物酔いの薬です。
 乗物酔いの予防、緩和にすぐれた効果を示すトラベラソフトは、旅行などのお出かけ時の常備薬としておすすめできます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
 他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 (眠気があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 (1)医師の治療を受けている人。
 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 (4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (5)次の症状のある人。
 排尿困難
 緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	排尿困難

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
 口のかき

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和


【用法・用量】

成人（15歳以上）は、乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に1回1錠を服用してください。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1錠を4時間以上の間隔をおき1日2回を限度として服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)本剤は15歳未満の小児には、服用させないでください。
- (3)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分・分量と作用】

1日量（2錠）中

成 分	分量	作 用
塩酸メクリジン	50mg	脳幹に作用してめまいや吐き気をおさえます。

添加物として、D-マンニトール、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルスターチ、サッカリンナトリウム水和物、タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、赤色102号を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

まれに錠剤に赤い斑点があらわれることがありますが、これは色素によるもので製品には異常ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元

グレンツメディカル株式会社

滋賀県蒲生郡日野町大谷東山341-32

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尾824