

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

# エスロート<sup>®</sup>「ニスキャップ」

第②類医薬品

乗物酔い薬 1日1回の持続性製剤 酔ってからでも効きます

- エスロート「ニスキャップ」は、乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛といった症状の予防・緩和にすぐれた効果をあらわすカプセル剤です。
- 効果が長く続く持続性製剤ですので、1日1回、乗物に乗る30分前の服用で効きめをあらわします。
- 乗物酔いが始まる前からでもすぐに服用すれば、乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛を緩和します。

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- ① 次の人は服用しないでください  
15才未満の小児。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）



### 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 高齢者。  
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5) 次の症状のある人。 排尿困難  
(6) 次の診断を受けた人。 緑内障、心臓病
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、便秘、下痢、眠気、目のかすみ

## 効能・効果

乗物酔いによるはきけ・めまい・頭痛の予防および緩和

## 用法・用量

次の1回量を1日1回、水又はぬるま湯で服用してください。  
ただし、乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用してください。

年齢	成人(15才以上)	15才未満
1回量	1カプセル	×服用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)食前・食後にかかわらず服用できます。

## 成分 1カプセル中

マレイン酸フェニラミン 30mg、スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.2mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB<sub>6</sub>）5mg、アミノ安息香酸エチル 50mg、無水カフェイン 20mg

添加物：二酸化ケイ素、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、トウモロコシデンプン、メタクリル酸コポリマーL、ラウリル硫酸Na、ビタミンB<sub>2</sub>、赤色3号、黄色5号、青色1号

## 乗物酔いの予防には

- バス・船・飛行機などに乗る前夜は、睡眠不足にならないよう気をつけましょう。
- 消化のよい食物を適度に食べ、胃腸の調子を整えましょう。
- 座席はなるべく揺れの少ない場所に、姿勢を楽にしてゆったりとすわりましょう。
- 窓から遠くの景色を眺めたり、おしゃべりやゲームなどで気分をまぎらわしましょう。
- 乗物酔いの薬は、あらかじめ服用しておく方が効果的です。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

### お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



**エスエス製薬株式会社**

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

③1

発売元



**オールジャパンドラッグ株式会社**

東京都中央区日本橋本町1-5-9