

ご使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

乗物酔防止薬

トラベック®内服液

第2類医薬品

乗物での旅行は楽しいものですが、すぐ気分が悪くなる方がいます。
トラベック内服液はそのような場合の乗物酔いのめまい、吐き気、頭痛をしずめる薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症	状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	
精神神経系	頭痛	
泌尿器	排尿困難	
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ	

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】 下記の量を服用してください。

年 齢	使用目的	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	乗物酔いの予防	1 瓶 (20mL) を乗車船30分前に服用してください	2 回まで
	必要に応じて追加服用する場合	1 瓶 (20mL) を4時間以上の間隔をおいて服用してください	
7 歳以上 15歳未満	乗物酔いの予防	1/2瓶 (10mL) を乗車船30分前に服用してください	
	必要に応じて追加服用する場合	1/2瓶 (10mL) を4時間以上の間隔をおいて服用してください	
7歳未満	服用しないでください。		

(添付のコップを使用してください。)

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 7歳未満の乳幼児には服用させないこと。

【成分・分量】

1 瓶(20mL)中に次の成分を含有します。

成 分	分量
塩酸メクリジン	30mg
スコボラミン臭化水素酸塩水和物	0.2mg
無水カフェイン	25mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、クエン酸、l-メントール、パラベン、エタノール、香料

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに服用すること。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

中外医薬生産株式会社 お客様相談室

電話 0595-21-3200

受付時間 9：00～17：00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5