

この添付文書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保存しておいてください。

第2類医薬品

乗りもの酔いに

ビビシック

思い出にのこる楽しい旅行も乗りものに酔っては辛いものになってしまいます。

ビビシックは十分に旅を楽しんで頂くために乗りもの酔いの予防をします。ビビシックは乗りものの動揺や加速度よりおこる内耳迷路の興奮を抑え、嘔吐中枢や自律神経を鎮静させて乗りもの酔いを防ぎます。

⚠ [使用上の注意]

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気があらわれることがある。)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
緑内障、てんかん、甲状腺機能障害
 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| その他 | 動悸、排尿困難 |
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
口のかわき

※[成分・分量] (1錠中)

成 分	分 量
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩	20.0mg
ジプロフィリン	20.0mg
日局 リボフラビン(ビタミンB ₂)	1.0mg

添加物としてリン酸水素Ca水和物、バレイショデンプン、ステアリン酸Mg、ヒプロメロースを含有する。

(裏面につづく)

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。これは吸収されたりボフラビンの一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。

〔効能・効果〕

乗物酔いによるめまい・吐きけ・頭痛の予防及び緩和。

〔用法・用量〕

乗物酔いの予防には、乗車船30分前に次の1回量を服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	4時間以上の間隔をおいて3回まで
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

必要に応じて追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。なお、1日の服用回数は3回までとしてください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

〔包装〕

12錠

〔お問い合わせ先〕

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電 話：03 (3370) 7174 (代表)

受付時間：9：00～17：00 (土・日・祝日を除く)

発 売 元 **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 **興亜製薬株式会社**
横浜市港北区箕輪町2-17-5