

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

胃腸薬

第2類医薬品

イスマゲン[®]エース錠

私たちの周囲には健康を脅かすいろいろな要素がありますが、精神的なストレスもまた健康を脅かす原因の一つです。

ストレスは臓器の中でも特に神経に敏感な胃に端的にあらわれ、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、胃炎などを引き起こします。

また、食べ過ぎや飲み過ぎのほか、卵などによる食物アレルギー、過剰な胃酸による胃粘膜刺激なども胃の正常な働きを妨げます。

イスマゲンエース錠は不快な胃の症状を改善し、胃の酸度を中和して胃粘膜を保護するすぐれた胃痛・胸やけ・胃のもたれなどの胃腸薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の方は服用しないでください
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人
腎臓病、高血圧、心臓病、緑内障
2. 次の場合には、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります
その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛

用法・用量

通常、次の量を食間に服用してください

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	3回
8才以上15才未満	1錠	
8才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- (3)錠剤の取り出し方
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分・分量

成人1日量（6錠）中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
メチルメチオニンスルホニウムクロリド（ビタミンU）	75mg	荒れた胃の粘膜を保護・修復し、胃の痛みをやわらげます
銅クロロフィリンナトリウム	54mg	
グリチルリチン酸モノアンモニウム	90mg	胃粘膜の保護作用があります
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌を抑え、胃の痛みを止めます
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	600mg	胃の余分な胃酸を即効的に中和して、胃酸過多や胃のもたれなどを治します
重質酸化マグネシウム	600mg	

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、L-メントール、セルロース、ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、マクロゴールを含有しています

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる）
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電話：(03)3370-7174（代表）
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）