

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人、
2. 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること、(2) 小児の手の届かない所に保管すること、(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)、(4) 使用期限を過ぎた製剤は服用しないこと、(5) 一度フタを開けたら、そのまま、保管しないで早めに服用すること。
※本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがありますが、よく振ってから服用すること。

〔成分・分量〕1日量(3瓶)中

塩化カルニチン……………600mg
オウバクエキス……………200mg
カンゾウエキス……………150mg
クワイチン……………3.0mL
シロキョウチンキ……………1.5mL
ニンジンエキス……………60mg
ゲンチアナエキス……………60mg
アカメガシワエキス……………135mg
添加物として、ポリオキシエチレン脂肪酸化ヒマシ油、白糖、D-ソルビトール、クエン酸Na、水和物、d-リンゴ酸、フマル酸Na、安息香酸Na、ブチルパラベン、L-メントール、エタノール、香料を含有します。

発売元  明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地
お客様相談室 ☎0120-956-9451
9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

発売元  天野商事株式会社
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号
お客様相談室 052-951-2940
9:00～17:00(土、日、祝日、特定休日を除く)

二日酔

のむかつき・食べ過ぎ

生薬製剤

新ビオエ[®]
内服液

第3類医薬品



製造販売元
明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地

健胃薬

12-2-E

〔用法・用量〕

成人(15歳以上) 1回1瓶(30mL)、1日3回を限度として服用する。なお、服用間隔は4時間以上おくこと。(小児には服用させないで下さい。)

〔効能・効果〕

食欲不振(食欲減退)、
胃部・腹部膨満感、消
化不良、胃弱、食べ過ぎ
(過食)、飲み過ぎ(過
飲)、胸やけ、もたれ(胃
もたれ)、胸つかえ、は
きけ(むかつき、胃の
むかつき、二日酔・悪
酔のむかつき、嘔気、悪
心)、嘔吐

金庫:キャップ

ガラス:瓶

30mL

副作用救済制度

☎0120-149-931

使用
期限

製造
番号

