

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

シグナル胃腸薬「顆粒」

第2類医薬品

食べすぎ・飲みすぎ・・・ 胃もたれ・胸やけ・胃の痛みに

- シグナル胃腸薬「顆粒」は、現代人の食生活やライフスタイルを考えてつくられた、のみやすく、溶けやすい胃腸薬です。
- シグナル胃腸薬「顆粒」は、食べすぎ・飲みすぎをはじめ、胃もたれ・胸やけ・胃の痛みなど、現代人に起こりがちな不快な症状によく効きます。

《作用と特長》

- 4種類の消化酵素が、各栄養素の消化をうながして、食べすぎ・飲みすぎなどによって起こる、胃もたれ・胸やけ・むかつきといった症状をしずめ、胃をスッキリさせます。
- 3種類の制酸剤の働きで、胃液のペーハーを適度に保ち、胸やけ・げっぷ・胸つかえなどの過酸症状をしずめます。
- 胃粘膜修復剤アルジオキサは荒れた胃の粘膜を正常な状態に近づけるよう作用し、またロートエキスは胃腸の働きをコントロールする神経に作用して胃液の過剰分泌を抑え、胃の痛みをしずめます。
- 芳香・辛味・苦味性健胃生薬の配合により、胃腸の働きを活発にし、弱った胃腸機能を回復させます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
- ② 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
- ③ 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
- ④ 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

- 食べすぎ、飲みすぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振
- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃弱
- 胸やけ、胸つかえ、胃酸過多、げっぷ
- 胃痛
- はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量

次の1回量を、1日3回食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	成人(15才以上)	8才～14才	5才～7才	5才未満
1回量	1包	1/2包	1/3包	✕服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分 1包(1.65g)中

消化酵素	ジアスメンSS	50mg		
	ピオチアスターゼ1000	40mg		
	プロザイム6	5mg		
	リパーゼAP6	10mg		
制酸剤	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	300mg		
	炭酸水素ナトリウム	400mg		
	沈降炭酸カルシウム	300mg		
鎮痛剤	ロートエキス	10mg		
胃粘膜修復剤	アルジオキサ	30mg		
健胃生薬	ガジュツ末	60mg	ショウキョウ末	10mg
	カンゾウ末	120mg	チョウジ油	0.73mg
	オウバク末	30mg	ケイヒ油	3.6mg
	ゲンチアナ末	20mg	ℓ-メントール	2.4mg

添加物：カルメロースCa、無水ケイ酸、乳酸Ca、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、D-マンニトール、バレイシヨテンブ、ウイキョウ油、ショウキョウ油

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
<http://www.ssp.co.jp/>