

第2類
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



健胃消化薬

ホミカロート錠

健胃・制酸・消化

ホミカロート錠は…

- 胃の働きを高める成分(ホミカエキス)、胃酸の分泌を抑える成分(ロートエキス)、消化酵素(ジアスターゼ)、健胃生薬(リュウタン末、センブリ末)、芳香性健胃薬(L-メントール)を配合した健胃消化薬です。
- 食べすぎや飲みすぎ、食欲のおとろえたとき、胃の働きが弱っているときなどに効果があります。
- 淡かっ色の錠剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬

2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

排尿困難

- (7) 次の診断を受けた人。

心臓病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。



〔効能〕

食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、もたれ(胃もたれ)、胸やけ、胃弱、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃部・腹部膨満感

〔用法・用量〕

下記の1回服用量を食後に服用します。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	5錠	3回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕5錠中

成分	分量	働き
ホミカエキス	10mg	苦味健胃薬として胃液の分泌を促し、食欲不振、食べすぎに効果をあらわします。
ロートエキス	10mg	胃酸の分泌を抑える働きがあり、胸やけなどに効果をあらわします。
ジアスターゼ	150mg	でんぷんを分解し、消化不良、食べすぎに効果をあらわします。
リュウタン末	75mg	苦味健胃薬として胃の働きを活発にし、消化不良、食べすぎに効果をあらわします。
センブリ末	10mg	健胃成分である苦味配糖体を含み、胃弱、食欲不振に効果をあらわします。
炭酸水素ナトリウム	400mg	過剰の胃酸をすみやかに中和し、胸やけなどに効果をあらわします。
l-メントール	2mg	芳香性健胃薬として胃の働きを促して消化促進、食欲不振に効果をあらわします。

添加物として、バレイショデンプン、乳糖、アラビアゴム、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号