

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

Y03

胃腸薬

第2類医薬品

たべすぎ・のみすぎ・胃のもたれに

新三共胃腸薬

《新三共胃腸薬》は次のような働きをもった薬剤です。

○消化酵素の働きで、食物の消化を助け、胃腸の負担を軽くします。

○制酸剤の配合により、過剰の胃酸を中和して、すみやかに胸やけなどの過酸症状を改善し、胃壁を保護します。

○スッキリとした味とかおりをもつ健胃和漢薬(生薬)の作用により、消化液の分泌をうながして、食欲を増し、胃腸の機能をたかめます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
便秘、下痢

■ 効能・効果

- 食べ過ぎ、飲み過ぎ、もたれ、胸つかえ、食欲不振(食欲減退)
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感
- 胸やけ、胃酸過多、胃痛、胃重、胃部不快感、げっぷ(おくび)
- はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐

■ 用法・用量

年齢	1回服用量	1日服用回数
15歳以上	1.4g	3回 食後に服用して下さい
11歳以上15歳未満	成人の $\frac{2}{3}$	
8歳以上11歳未満	成人の $\frac{1}{2}$	
5歳以上8歳未満	成人の $\frac{1}{3}$	
3歳以上5歳未満	成人の $\frac{1}{4}$	
3歳未満	服用しないで下さい	

添付の計量さじ1杯が約1.4gに相当します。

<用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分

《新三共胃腸薬》は、淡灰色～灰かっ色の散剤で、特異のかおりと味があり、1.4g中に次の成分を含有しています。

成分	含量 (1.4g中)	作用
タカヂアスターゼN1	25 mg	広いpH域で働く消化酵素で、消化を助け、栄養の吸収をよくする
タカヂアスターゼA	150 mg	
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	320 mg	持続的な制酸作用を有する また胃粘膜の炎症面を保護する働きもある
炭酸水素ナトリウム	300 mg	速効的な制酸作用を有し、胸やけ、げっぷ(おくび)などの過酸症状を改善する
沈降炭酸カルシウム	225 mg	
オウレン末	15 mg	味や香りによって味覚を刺激し、胃液や消化液の分泌を調節し、消化を助ける
オウバク末	35 mg	
ケイヒ末	74.5mg	
ウイキョウ末	20 mg	
チョウジ末	10 mg	
ショウキョウ末	24.5mg	
l-メントール	2 mg	
カンゾウ末	118 mg	胃腸の過度の緊張をおさえて、胃壁を保護する

添加物：サンショウ、パレイシヨダンブ

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後はなるべく早くご使用下さい(品質保持のため。)
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03(6667)3232
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

Y03

