

第2類医薬品

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

食欲不振・胃もたれ・胃酸過多に サンコロト末(分包)

「食欲がない」「胃がもたれる」「胸やけがする」というときは、胃の働きが穏やかではありません。
サンコロト末(分包)はこのような症状を改善させます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと 透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合には授乳をさけること (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることもある。

効能・効果

- 食べすぎ、飲みすぎ、食欲不振(食欲減退)
- 胃もたれ、胃酸過多、胸やけ、胸つかえ、胃重
- はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- 消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹部膨満感

用法・用量

年 齢	15才以上	8才以上15才未満	5才以上8才未満	5才未満
1 回量	1 包	1 / 2 包	1 / 3 包	服用しないこと

1日3回食後に服用すること。

(用法及び用量に関する注意)

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

成分・分量

3包(3g)中

成 分	分量	成 分	分量
ウルソデオキシコール酸	20mg	ソウジュツ末	150mg
ニンジン末	50mg	チョウジ末	50mg
オウレン末	50mg	モッコウ末	100mg
エンゴサク末	200mg	合成ヒドロタルサイト	900mg
オウゴン末	50mg	ロートエキス散	300mg
ケイヒ末	300mg	ピオヂアスターゼ1000	30mg
ガジュツ末	100mg		

添加物として乳糖、ℓ-メントールを含有いたします。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります)

作用・特長

- ◎ウルソデオキシコール酸が胃液、すい液、胆汁の分泌を促し、脂肪などの消化を助けます。
- ◎ニンジン末、オウレン末などの健胃生薬が消化液の分泌を促し、胃腸機能の虚弱症状を改善します。
- ◎合成ヒドロタルサイトの速効性、持続性にすぐれた制酸効果により、胃の不快な症状を和らげます。
- ◎ロートエキス散は、迷走神経に作用して胃腸の運動亢進(緊張)や、胃酸の分泌を整えます。
- ◎消化酵素ピオヂアスターゼは、食べすぎ、飲みすぎ、食欲不振などに対し、胃腸の負担を軽減します。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

福井製薬株式会社・お客様相談室「06-6939-2677」

受付時間…9:00～17:00(土、日、祝祭日を除く)

発売元

サントリー薬品株式会社
東京都日野市旭ヶ丘6丁目11番1号

製造販売元

福井製薬株式会社
大阪市城東区今福東3丁目1番26号
<http://www.fukui-pharm.jp/>