

ご使用に際し、この添付文書は必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

制酸薬・健胃薬

西海分包胃散



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)高齢者
 - (3)次の症状のある人。
むくみ
 - (4)次の診断を受けた人。
腎臓病、高血圧、心臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2)5～6日間位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘、下痢

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）

【用法・用量】

次の1回量を1日3回、食後なるべく30分以内に水またはお湯と一緒に服用すること。

年齢区分	服用量(1回量)
15歳以上	1包
11歳以上15歳未満	2/3包
8歳以上11歳未満	1/2包
5歳以上8歳未満	1/3包
5歳未満	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】 1日量 3包(3,900mg)中

成分	分量	はたらき
炭酸水素ナトリウム	1,500mg	制酸剤 即効性、持続性、遅効性などの作用の異なる各制酸剤が、胃の中の酸を効果的に調整し、胸やけ、重圧感を取り、清涼感を与えます。
沈降炭酸カルシウム	535mg	
炭酸マグネシウム(重質)	440mg	
ケイヒ末	250mg	さわやかな香りの生薬が胃液や消化液の分泌を調整し、胃の機能を高めます。
シヨウキョウ末	100mg	
カンゾウ末	950mg	ストレスによる胃腸の緊張をしずめ、胃粘膜のただれを修復します。
ダイオウ末	100mg	大腸の運動をととのえ、自然に近い便通を促します。

添加物：ℓ-メントール、ウイキョウ末

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光のあたらない湿気の少ない、涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 誤用をさげ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折りかえし保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先

製造販売元 西海製薬株式会社

住所 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦192番地

電話番号 0942-92-2303(代)

受付時間 9:00~16:00(土、日、祝日を除く)