

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるように大切に保存してください。

第3類医薬品

和漢生薬配合

イーワン

胃もたれ、胸やけ、
二日酔いのむかつき



使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

用法及び用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
11歳以上 15歳未満	3錠	
8歳以上 11歳未満	2錠半	
5歳以上 8歳未満	1錠半	
5歳未満	服用しないでください	

以上いずれも1日3回、食後水又は白湯にて服用してください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

《裏面もよくご覧ください》

効能又は効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

成分及び分量 1日量(15錠)中

成分	分量
重質酸化マグネシウム	300mg
炭酸水素ナトリウム	700mg
ウコン末	200mg
オウレン末	180mg
ガジュツ末	200mg
センブリ末	50mg
ウルソデオキシコール酸	35mg
げんのしょうこエキス (原生薬換算量1120mg)	280mg

添加物として、ハッカ油、セルロース、乳糖、バレイショデンプン、CMC-Ca、タルク、ステアリン酸Mgを含有します。

<保管及び取り扱い上の注意>

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 **大同製薬株式会社**

お客様 **富山県高岡市三女子113**

相談窓口 **電話:(0766)22-0998**

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931