

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

総合胃腸薬 協和胃腸薬〈細粒〉

協和胃腸薬〈細粒〉は健胃薬、制酸剤、消化酵素、鎮痛鎮痙薬を配合した総合胃腸薬です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

 - (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

胃酸過多、胃部不快感、胃もたれ、胃痛、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、飲み過ぎ、胸つかえ、げっぷ、食欲不振、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、消化不良による胃部・腹部膨満感、胸やけ

用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守して下さい。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

1日量(3包)中

1包:1g

成分	分量
バイオチアスターゼ1000	150mg
合成ヒドロタルサイト	1500mg
ロートエキス	30mg
ショウキョウ末	120mg
ゲンチアナ末	75mg
ケイヒ末	300mg
ウイキョウ末	105mg
チョウジ末	60mg

添加物として、L-メントール、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリドン、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 0120-468771

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

協和薬品工業株式会社

* 岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

* 本社:東京都世田谷区上祖師谷1丁目11番3号