

使用上の注意/**してはいけないこと**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)1.次の方は服用しないこと 透析療法を受けている人。2.長期連用しないこと **相談すること**1.次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談すること (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)次の診断を受けた人。腎臓病 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること 2週間位服用しても症状がよくなる場合
用法・用量/成人(15歳以上)1日1回、1本を服用する。

●用法・用量を厳守すること。
成分・分量/(50mL中)合成ヒドロタルサイト600mg オキソアミジン末30mg 人参乾燥エキス90mg(原生薬換算量603mg) 生姜流エキス0.3mL ゴシユ流エキス0.3mL 蒼朮流エキス0.4mL ウルソデオキシコール酸15mg カンゾウエキス末86mg(原生薬換算量602mg) ハッカ油10mg チンピエキス100mg(原生薬換算量500mg) [添加物]白糖、セルロース、カルメロースNa、ポビドン、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノール
●懸濁内服液ですので服用の際、瓶をよく振ること。

●お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター TEL03-3279-7755

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



胃腸薬



第2類医薬品

液キヤベ^{コーワ}S


胃痛・ムカムカ・もたれ

胃がスキツとする

●効能・効果/飲み過ぎ、胃重、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、もたれ、嘔吐、胃酸過多、げっぷ、胃部不快感、食べ過ぎ、胃部・腹部膨満感、消化不良、胸やけ、胸つかえ、食欲不振、胃弱、胃痛

保管及び取扱い上の注意/(1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

50mL

製造販売元
興和株式会社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
製造
中外医薬生産株式会社 
三重県伊賀市ゆめが丘七丁目5-5 工

製造番号

使用期限