

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 胃の痛み・胃重・食欲不振

# 新サボロ® 胃腸薬

第2類医薬品

アルジオキサ・合成ヒドロタルサイト配合

### 特徴

毎日の食生活において、ついつい食べすぎたり、飲みすぎなどで胃が重くなり、胸やけ・胃もたれ・胃痛などの症状があらわれます。

新サボロ胃腸薬は、このように弱った胃腸を元の状態に治してくれる複合胃腸薬です。

1. 胃粘膜再生促進作用成分アルジオキサ及び持続性を工夫した胃粘膜保護・制酸作用成分合成ヒドロタルサイトが胃酸過多などであれた胃粘膜を修復し、弱った胃腸のはたらきを活発にして、食欲や消化力を回復させます。
2. 消化酵素ビオヂアスター1000、胆汁酸分泌促進作用成分ウルソデオキシコール酸、生薑（イキョウ末、ケイヒ末等）等が消化を助け、胃の不快な症状を取り除きます。



### 使用上の注意

#### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
4. 長期運用しないでください

#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## その他の注意

- ・母乳が出にくくなることがあります。

## 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胃痛、胃部不快感、胃部膨満感、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、飲みすぎ（過飲）、消化促進、消化不良、食欲不振（食欲減退）、食べすぎ（過食）、消化不良による胃部・腹部膨満感

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2／3包	
8歳以上11歳未満	1／2包	
8歳未満	服用しないでください	

〔食間とは…食後2～3時間を持ちます。〕

## 《用法・用量に関する注意》

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。

## 成分とはたらき


淡褐色と淡黄色の細粒で次の成分を含んでいます。

成 分	3包(3.6g) 中	は た ら き
合成ヒドロタルサイト	1500mg	胃酸を中和し、胃粘膜を保護する
アルジオキサ	90mg	胃粘膜の再生を促進する
ウルソデオキシコール酸	30mg	胆汁酸の分泌を促進する
ビオチアスターゼ1000	120mg	たんぱく質及びでんぶんを消化する
ロートエキス3倍散 (ロートエキスとして30mg)	90mg	胃液の分泌を抑制し、胃の痛みを抑える
カンゾウ末	150mg	胃の炎症を抑え保護する
ウイキョウ末	90mg	《芳香健胃生薬》
ケイヒ末	150mg	胃腸の機能を改善し、胃もたれ不快感を抑える
ショウキョウ末	90mg	

添加物として、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、パレイショデンブン、デキストリン、L-メントールを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## お客様相談係

電話番号：076(431)8863[ティカ製薬(株)]

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

## 副作用被害救済制度

☎0120-149-931

## 包 装

16包入 [アルミ箔入]