

胃腸鎮痛鎮痙薬

腹痛・胃痛に

ナルコリン®「カプセル」

ナルコリン「カプセル」は…

- 痙れん性の痛みをやわらげる臭化水素酸スコポラミンと塩酸パパペリンを配合しています。
- 1回1カプセルで、さしこむような痙れん性の腹痛や胃痛に効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
15歳未満の小児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

- (2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
口のかわき、便秘、下痢

【効 能】

腹痛、さしこみ(疝痛、痙)、胃痛、胃酸過多、胸やけ

【用法・用量】

下記の1回服用量を服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1カプセル	3回を限度とします
15才未満	服用しないでください	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) **カプセルの取り出し方**
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



【成分・分量と働き】3カプセル中

成 分	分 量	働 き
臭化水素酸スコポラミン	300μg	副交感神経に作用して痛みを抑えるとともに、胃腸の異常な緊張をやわらげます。
塩酸パパペリン	60mg	胃や腸の筋肉自体に作用して、痙れんを鎮め、また、それによって起こる痛みを抑えます。
アミノ安息香酸エチル	280mg	炎症によって起こる痛みを抑えます。

添加物として、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、タルク、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、青色1号、赤色3号を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。
- (5) カプセル剤は、吸湿しやすいので、ぬれた手などで、触れないように注意してください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせ申し上げます。

佐藤製薬株式会社 医薬情報部「お客様相談課」
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

MANUFACTURED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. TAIWAN
IMPORTED & DISTRIBUTED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. JAPAN
MADE IN TAIWAN