

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

## 胃腸鎮痛鎮痙薬

# ブスポンS

第2類医薬品

胃痛・腹痛・さしこみに

胃や腸等を動かしている内臓平滑筋のけいれんや過度の緊張により、胃痛、腹痛、さしこみ等の症状があらわれます。

ブスポンSは白色の糖衣錠で、主成分のブチルスコポラミン臭化物は内臓平滑筋のけいれんや過度の緊張を抑え、胃酸の分泌を抑えることにより、胃痛、さしこみ、胸やけ等の胃腸症状に優れた効果をあらわします。

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。)
3. 次の人は服用しないこと  
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)高齢者。
  - (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6)次の症状のある人。  
排尿困難
  - (7)次の診断を受けた人。  
心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。

- (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること  
口のかわき、便秘

## 【効能・効果】

胃痛、腹痛、さしこみ（<sup>せんつう</sup>疝痛、<sup>しゃく</sup>癥）、胃酸過多、胸やけ

## 【用法・用量】

大人（15才以上）は1回1錠、1日3回を限度として服用して下さい。  
服用間隔は4時間以上おいて下さい。

### （用法・用量に関連する注意）

- (1)定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児には服用させないで下さい。
- (3)錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り取り出して下さい。  
（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



## 【成分・分量】

1錠中、ブチルスコポラミン臭化物10mgを含有する。  
添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、ステアリン酸カルシウム、白糖、沈降炭酸カルシウム、アラビアゴム、ゼラチン、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有する。

## 【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

### （お客様相談窓口）

本剤についてのお問い合わせは下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

キョーリンリメディオ株式会社 学術部

〒920-0017 金沢市諸江町下丁287番地1

電話番号 076-239-2496 受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

発売元

**小林薬品工業株式会社**

東京都中央区日本橋箱崎町40番6号

製造販売元

**キョーリンリメディオ株式会社**

富山県南砺市井波885番地