



第2類医薬品

行者丸

赤五

下痢止め薬

〔効能・効果〕

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

〔用法・用量〕

成人（15歳以上）……………1回 4錠
15歳未満11歳以上……………1回 3錠
11歳未満8歳以上……………1回 2錠
8歳未満5歳以上……………1回 1錠
5歳未満は服用しないこと。

1日3回食前又は食間に服用する。
ただし、服用間隔は4時間以上おくこと。
※小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分・分量〕1日量（12錠）中

ベルベリン塩化物水和物……………200mg	シャクヤクエキス粉末……………180mg
ロートエキス……………50mg	（原生薬換算量……………700mg）
合成ヒドロタルサイト……………750mg	ゲンショウコエキス粉末……………600mg
カンゾウエキス粉末……………150mg	（原生薬換算量……………3780mg）
（原生薬換算量……………700mg）	

添加物として、赤色102号、タルク、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、酸化チタンを含有する。

製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社** お問い合わせ先 消費者相談窓口 電話 0745-22-3601
奈良県大和高田市根成柿574 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

第2類医薬品

行者丸赤五

 **してはいけないこと**

 **《使用上の注意》**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1.次の人は服用しないこと 透析療法を受けている人。2.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬 3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある。) 4.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。) 5.長期連用しないこと

 **相談すること**

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1)医師の治療を受けている人。(2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)高齢者。(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6)次の症状のある人。排尿困難 (7)次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、緑内障

2.服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 口のかわき、便秘、下痢、目のかすみ 4.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

その他の注意

母乳が出にくくなることがある。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

《保管及び取扱上の注意》

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。



8錠入(2回分) ¥250 外袋 内袋

配置期限 2017.2 BIB3

品目番号 奈良9-131-2巻

AS-5A