

ピサコジル製剤

第2類医薬品

ハミノン[®]

便秘治療薬

特長

- 胃・小腸ではほとんど作用せず、大腸粘膜に直接作用する接触性下剤ですので優れた効果をあらわします。
- おやすみ前に服用しますと翌朝にお通じがえられます。
- 小さく飲みやすいピンク色の腸溶性フィルムコーティング錠です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
2. 大量に服用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能】

- ◎ 便秘
- ◎ 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【用法・用量】

次の量を1日1回、就寝前（または空腹時）に水又はお湯で、かまわずに服用してください。

年 齢	1 回服用量	
	2～3日便通のない時	4日以上便通のない時
大人(15歳以上)	1～2錠	2～3錠
11歳以上15歳未満	1 錠	1～2錠
11歳未満	服用しないでください	

ただし、便秘の症状には個人差がありますので、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量（上記の最大量まで）又は減量してください。

★裏面につづく

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 制酸剤（多くの胃薬に含まれている成分で、胃酸を中和する働きがあります）や牛乳を飲んでから1時間以内の服用はさけてください。（本剤は制酸剤や牛乳と同時に飲むと胃内で溶解し、期待された効果を発揮できないことがあります）
- (4) 錠剤をかんだり、つぶしたりせずにそのまま服用してください。（本剤は有効成分が腸で溶けるように、腸溶性のフィルムコーティングを施しています）
- (5) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている PTP シートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）



【成分・分量と働き】


3錠（大人1日最大量）中に次の成分を含んでいます。

成分	分量	働き
ビスコジル 〔2-(4,4'-ジアセトキシジフェニルメチル)ピリジン〕	15mg	大腸を直接刺激し、腸管のぜん動運動をたかめ、排便をうながします。

添加物として乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、ヒプロメロース酢酸エステルコハク酸エステル、クエン酸トリエチル、赤色102号、カルナウバロウを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



便秘解消のアドバイス

1. 毎朝、一定時間トイレに入り、規則的な排便習慣をつけましょう。
2. 繊維質の多い野菜や果物、水分を多くとるよう心がけてください。
3. 適度な運動と、腹部のマッサージなどを心がけてください。
4. 起床時に、冷たい水または牛乳を飲んで腸の運動を促しましょう。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

堀井薬品工業株式会社 企画開発部 お客様相談室
フリーダイヤル ☎0120-010-320

(06-6942-3485)

FAX 06-6942-1505

受付時間 9:00~17:40（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.horii-pharm.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎0120-149-931

製造販売元



堀井薬品工業株式会社

ホリア

大阪市中央区内淡路町1丁目2番6号