

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ガスとり成分配合 植物性便秘薬

第2類医薬品

ウィズワンプラス[®]


with One⁺

便秘や便秘に伴う症状の緩和に

〔特 徴〕

ウィズワンプラスは、食物繊維（ダイエタリーファイバー）と生薬成分に加え、おなかのガスを取り除く働きがある消泡剤を新たに配合した、穏やかに作用して自然に近いお通じを促す便秘薬です。

- 食物繊維＋生薬成分。
プランタゴ・オバタ種皮（膨潤性）＋センノシド（刺激性）の物理的、化学的作用によって自然に近いお通じを促し、排便のリズムを戻します。
- ジメチルポリシロキサン^{*}の消泡作用により、胃や腸内に発生したガス溜まりをつぶし、ガスの排出を促進して、便秘に伴うおなかの張り（腹部膨満）を改善します。
- 生活の欧風化に伴って、日常の食生活でとかく不足しがちな繊維質を補いますので、繊維不足が原因となっている便秘にも適しています。
- 服用しやすいグレープフルーツ風味の顆粒剤で、携帯に便利なスティック包装ですから、必要な数だけ外出先や旅行先にお持ちになることができます。ウィズワンプラスは、便秘の不快な症状と便秘に伴う腹部膨満や肌あれをしずめ、規則正しい排便リズムを作ります。



*便秘について

便秘の原因としては、

- 大腸のぜん動運動のおとろえ、緊張の低下
 - 腸内で水分が吸収されすぎて、便が硬くなる
 - 食生活の欧米化に伴い食物繊維の摂取が減少し、便のカサ（容量）が不足する等があげられます。
- また、便秘になるとおなかが張る、肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振等の症状を伴うことがあります。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

(2) 1週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
下痢

（必ず裏面もお読みください）

〔効能・効果〕

・便秘

・便秘に伴う次の症状の緩和：腹部膨満、肌あれ、吹出物、頭重、のぼせ、食欲不振（食欲減退）、腸内異常発酵、痔

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	用 法
成人（15才以上）	3/4～1包	1日1～3回毎食後に服用してください。 ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や、状態を見ながら少しずつ増量又は減量してください。
11才以上15才未満	1/2～2/3包	
3才以上11才未満	1/4～1/3包	
3才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) コップ1杯（約180mL）の水又はぬるま湯でかまずにおのみください。

〔成 分〕 1日量6g（3包）中

成 分	分 量	は た ら き
プラントゴ・オバタ種皮末	2,250mg	腸内で水分を吸収して膨張し、便のカサを増やして、腸のぜん動運動を促します。腸内細菌や腸内異常発酵による毒素を吸収して、腸への刺激を取り除く作用もあります。硬くなった便に適度なやわらかさを与えて、自然に近いお通じを促します。
センノシド	83.53mg <small>（センノシドA・Bとして48mg）</small>	植物センナに含まれている成分で、腸のぜん動運動を高め、弱った腸の働きを活発にします。
ジメチルポリシロキサン	180mg	腸内で発生したガス溜まりを消去し、腹部膨満を緩和します。

添加物として、乳糖水和物、粉末還元麦芽糖水アメ、L-メントール、香料、プロピレングリコール及びエタノールを含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の服用により、尿が黄褐色又は赤色になることがありますが、これは主成分のセンノシドによるものですから心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）


受付時間 9：00～17：50（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

発売元
 **ゼリア新薬工業株式会社**
東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元
 **日新製薬株式会社**
山形県天童市清池東二丁目3番1号

自分で自分の健康
を守ろう
Self-Medication