

HEARTRICK

どうき・息ぎれ・めまいに

ハートリック

内服液

第2類医薬品

30_{mL} × 2

【成分・分量】

1びん(30mL)中
ゴオウチンキ・・・500 μ L
ニンジンエキス・・・10mg
塩酸チアミン・・・10mg
リン酸リボフラビンナトリウム
・・・・・・・・・・・・・・・・5mg
塩酸ピリドキシリン・・・1mg
シアノコバラミン・・・2 μ g
ニコチン酸アミド・・・20mg
塩化カルニチン・・・50mg
イノシトール・・・50mg
パントテン酸カルシウム
・・・・・・・・・・・・・・・・10mg
L-グルタミン酸ナトリウム
・・・・・・・・・・・・・・・・20mg
重酒石酸コリン・・・50mg
グルクロノラクトン・・・50mg
アミノエチルスルホン酸
・・・・・・・・・・・・・・・・500mg

添加物：安息香酸、パラベン、
バニリン、プロピレングリコール、
香料、クエン酸、D-ソルビトール、
エタノール、白糖

●生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の強心薬

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。
消化器：悪心・嘔吐
- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

米田薬品株式会社 大阪市浪速区塩草3丁目2-2

お客様相談窓口 電話 06-6562-7411

受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

第2類医薬品

販売名:

ハートリック内服液

[効能・効果]

どうき、息ぎれ、めまい

[用法・用量]

成人(15歳以上)1回1びん(30mL)を1日1～2回服用してください。

●定められた用法・用量を厳守してください。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。