

コレステロールが気になる方に

第3類医薬品

血清高コレステロール改善薬 コレステライク

 シオノギ製薬

コレステライクは、パンテチンの働きによって脂質代謝を改善し、血中の総コレステロールを減少させます。またノイステロールが、コレステロールの腸管からの吸収を阻害し、体外への排泄を促します。さらに、天然型ビタミンEが、血管に障害を与える過酸化脂質の増加を抑え、末梢の血行をよくします。コレステライクは、これらの成分に加えて、ポリフェノール的一种でソバに多く含まれ、血管を丈夫にするルチンと、血管を正常に保つビタミンB6を配合しています。



使用上の注意……

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、胃部不快感、胸やけ、食欲不振、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
下痢、軟便
- 1ヵ月位服用してもコレステロール値の改善がみられない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください（1ヵ月ほど服用後、医療機関でコレステロール値の測定をすること）
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

……効能・効果……

血清高コレステロールの改善

血清高コレステロールにともなう末梢血行障害（手足の冷え・しびれ）の緩和

……用法・用量……

次の量を食後におのみください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15 才以上）	2 カプセル	3 回
15 才未満	服用させないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 血清高コレステロールの改善には食事療法が大切なので、本剤を服用しても食事療法を行ってください。

……成分・分量……

コレストライクは、淡黄褐色の楕円形の軟カプセル剤で、6 カプセル（成人 1 日量）中に次の成分を含有しています。

成 分	含量 (6 カプセル中)
パンテチン	375mg (脱水物換算 300mg)
大豆油不けん化物（ソイステロール）	600mg
酢酸 <i>d</i> - α -トコフェロール（天然型ビタミン E）	100mg
ルチン	60mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミン B ₆ ）	10mg

添加物として ポリソルベート 80、サフラワー油を含有しています。またカプセル本体に、ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール液、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、三二酸化鉄を含有しています。

……保管および取り扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管してください。（ビンのフタの開め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めてください）
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変化します）
- (4) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (5) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から、なるべく早めにご使用ください。
- (7) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「**医薬情報センター**」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9 時～17 時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

販売元

塩野義製薬株式会社
大阪府中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

明治製薬株式会社
富山県滑川市中原77番地