

# 血清高コレステロールの改善薬

# コレステラン®


## 酪酸リボフラビン配合

### コレステランは…

- 血液中のコレステロール値を低下させ、血清高コレステロールの改善に効果をあらわします。

血液中のコレステロールは、体の細胞やホルモンを作るのにはならない大切な成分ですが、血液中に多すぎると血管の壁にたまりやすくなります。

- 配合されている酪酸(らくさん)リボフラビンが、血清高コレステロールの改善に効果をあらわします。



### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。  
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用してもコレステロール値の改善がみられない場合(1ヵ月ほど服用した後、医療機関でコレステロール値の測定をしてください。)

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

下痢

#### ■ 効能・効果

血清高コレステロールの改善

#### ■ 用法・用量

次の1回量を、1日2回服用します。

年齢	1回量
15歳以上	1カプセル
15歳未満	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

## ■成分・分量

1日量(2カプセル)中

酪酸リポフラビン……………60mg

添加物としてゼラチン、サラシミツロウ、エチルパラベン、プロピルパラベン、黄色5号、中鎖脂肪酸トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、濃グリセリン、酸化チタンを含有します。

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により、尿が黄色くなるがありますが、これは本剤に含まれる酪酸リポフラビンによるものです。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) カプセル剤は、湿気の影響を受けやすいので、濡れた手などで触れたカプセルを容器に戻したりしないよう注意してください。
- (5) 期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## コレステロール値の高い方は……

普段の食事に気を付けることが必要です。

1. 動物性の脂肪(肉やバターに含まれるもの)と植物性の脂肪をバランスよく摂るようにしましょう。
2. ビタミンEが多く含まれる玄米、大豆などを摂るようにしましょう。
3. コレステロールを多く含む卵、バター、イカ、レバー、タコ、エビなどは、ほどほどに摂るようにしましょう。
4. 塩分は控えめにしましょう。
5. 食物センイを多く摂るようにしましょう。
6. 糖分が多い果物は、食べすぎないようにしましょう。
7. 夜食はつつしむようにしましょう。夜に必要な以上のカロリーを摂ると、余分なコレステロールが作られてしまいます。



## ■お問い合わせ先

株式会社タキザワ漢方廠 お客様相談室 ☎048-688-7923  
受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元  
株式会社 **タキザワ漢方廠**  
さいたま市見沼区片柳412-1