

血清高コレステロール改善薬
アクネザール[®]
リボフラビン酪酸エステル配合

■製品の特徴

高脂血症は、高血圧症、糖尿病などとともに生活習慣病のひとつであり、その予防や治療には日常の生活習慣の改善が必要です。

本剤の服用だけでなく、次のようなことを心がけることが大切です。

- 食事療法 ● バランスのとれた食事内容にし、摂取カロリーを制限する。
● 食物繊維を多く摂り、糖分や脂肪分の摂取を控える。
- 運動療法 ● ウォーキング、ジョギング、水泳など自分に適した運動を継続して行う。
- 生活習慣 ● 禁煙に努め、飲酒は適量にする。
● 十分な睡眠と規則正しい生活を送る。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胸やけ、胃部膨満感、食欲不振

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
○下痢
- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■ 効能・効果

血清高コレステロールの改善

■ 用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法、用量をお守りください。

■成分・分量 1日量(4錠)中

成分	分量
リポフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂)	60mg

添加物としてトウモロコシデンプン、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルクを含有する

【成分・分量に関連する注意】

※ビタミンB₂は、体内に吸収され、その一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色くなることがあります。

※本剤に見られるわずかな赤い斑点は、本剤を製造するときに有効成分をそのまま成型したことによるものです。

■保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)又、本剤の容器に本剤以外のものを入れないでください。
- 4.使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 5.容器の中の詰め物は、輸送中に本剤が破損するのを防止するために入れてありますので、フタを開けた後は捨ててください。ただし、乾燥剤はそのまま容器に入れた状態で保管してください。
- 6.容器の中の乾燥剤は服用しないでください。
- 7.容器のフタのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずフタをしっかりとめてください。
- 8.本剤に水分がつきますと、表面が変色したり、亀裂が生じたりすることがありますので、ご注意ください。
- 9.外箱と容器の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。
- 10.一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- 11.この説明文書には、本剤を服用するときに必要な注意事項などが記載されていますので、服用が終わるまで本剤とともに外箱に入れて保管してください。



説明文書はいつでも
読めるように外箱に保管



お問い合わせ先

ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口 ☎076-438-1107
受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9:00～17:00

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)